


Traitements en cours réalisé par d'autres prescripteurs

Vous n'êtes pas le seul prescripteur, et vous ne savez pas où inscrire correctement le traitement spécialisé prescrit par un autre, afin qu'il puisse y avoir prise en compte des alertes de pharmacovigilance.

Pour cela, il faut aller au niveau de l'onglet « antécédents » dans le dossier « codifiés » : ligne « traitement en cours »



Vous y trouvez déjà le traitement « en cours » que vous avez prescrit.




Un clic sur « ajouter »




permet d'enregistrer un titre d'ordonnance, le nom du prescripteur par exemple



après validation, vous ouvrez la pharmacie qui permet de rédiger l'ordonnance du spécialiste, ce qui donne après validation :



et tout ceci est repris au niveau du résumé du dossier.



Vous pourriez aussi rajouter une ordonnance « auto-prescription » si nécessaire.

Au moment de votre prescription, la/les ordonnances « traitement en cours » sont prises en compte pour les alertes de pharmacovigilance. (au moins pour les IAM)

Dans le cas présent, la prescription de PIROXICAM provoque une alerte d' IAM

Posologie : PIROXICAM BIOGARAN 10 mg gél : B/30

Préenregistrée : 1 gélule 1 fois par jour le matin pendant les repas

Libre :

Prescription

I CI A DCI | Alarmes : 2 ▲

DCI ▼ Désignation et posologie

PIROXICAM BIOGARAN 10 mg gél : B/30 1 gélule 1 fois pa

Substituer...

car dans l'ordonnance enregistrée en ATCD / « traitement en cours », est mentionné TERALITHE.

Liste des produits en interactions

Interactions

- TERALITHE 250 mg cp séc : B/100 + PIROXICAM BIOGARAN 10 mg gél : B/30
- AVLOCARDYL 40 mg cp séc : B/50 + PIROXICAM BIOGARAN 10 mg gél : B/30

Détail de la sélection : TERALITHE 250 mg cp séc : B/100 + PIROXICAM BIOGARAN 10 mg gél : B/30

IAM Association déconseillée

- > **TERALITHE 250 mg cp séc : B/100** (Traitement en Lithium)
- > **PIROXICAM BIOGARAN 10 mg gél : B/30**
Anti-inflammatoires non stéroïdiens

Nature du risque	Augmentation de la lithémie pouvant être évitée, surveillée
Conduite à tenir	Si l'association ne peut être évitée, surveiller après l'arrêt de l'anti-inflammatoire non stéroïdien

Ycl